

Teoria do Risco

Aula 20-Parte 1

Danilo Machado Pires
danilo.pires@unifal-mg.edu.br

PROBABILIDADE DE RUÍNA

$$T_t = \begin{cases} \min\{t | t \geq 0 \text{ e } U(t) < 0\} \\ \infty \text{ se } U(t) \geq 0 \text{ para todo } t \end{cases}$$

Probabilidade de ruína **no horizonte infinito em tempo contínuo** é definido por:

$$\psi(u) = P(T_t < \infty) = P(U(t) < 0, \forall t \ 0 \leq t < \infty) = 1 - \varphi(u)$$

Probabilidade de ruína **no horizonte finito em tempo contínuo** é definido por:

$$\psi(u, \tau) = P(T_t < \tau) = P(U(t) < 0, \forall t, 0 \leq t < \tau) = 1 - \varphi(u, \tau).$$

$$\psi(u, \tau) \leq \psi(u)$$

PROBABILIDADE DE RUÍNA

$$\widetilde{T}_n = \min\{n : U(n) < 0\}.$$

Probabilidade de ruína no horizonte infinito em **tempo discreto** é definida por:

$$\tilde{\psi}(u) = P(\widetilde{T}_n < \infty | U(0) = u) = P(U(n) < 0, \forall n, 0 \leq n < \infty) = 1 - \tilde{\varphi}(u).$$

Probabilidade de ruína no horizonte finito em **tempo discreto** é definido por:

$$\tilde{\psi}(u, \tau) = P(\widetilde{T}_n < \tau) = P(U(n) < 0, \forall n, 0 \leq n < \tau) = 1 - \tilde{\varphi}(u, \tau).$$

$$\tilde{\psi}(u, \tau) \leq \tilde{\psi}(u)$$

PROBABILIDADE DE RUÍNA NO HORIZONTE INFINITO NO CASO POISSON COMPOSTO

A probabilidade de ruína em período infinito $\psi(u)$ pode ser calculada por:

$$\psi(u) = \frac{e^{-Ru}}{E(e^{-RU(T)} | T_t < \infty)}, u \geq 0$$

Em que $U(T)$ é o valor da reserva no momento da ruína e R é o coeficiente de ajustamento.

*Teorema fundamental do Risco

Definição Seja X a variável aleatória que representa o valor de um sinistro, o coeficiente de ajustamento $r = R$ é a menor solução não trivial da equação em r :

$$M_{S_t-ct}(r) = 1$$

Em que $M_{S_t-ct}(r) = E(e^{r(S_t-ct)})$,

$$M_{S_t-ct}(r) = E(e^{r(S_t-ct)}) = 1$$

$$e^{-rct} E(e^{rS_t}) = 1$$

$$e^{-rct} M_{S_t}(r) = 1$$

$$M_{N_t}(\ln M_X(r)) = e^{rct}$$

EXEMPLO 1: Considere que a variável aleatória associada a 1 sinistro seja $X \sim \text{Exp}(\alpha)$ e que $N_t \sim \text{Po}(\lambda t)$. Encontre o valor não trivial de R considerando o prêmio $c = \frac{\ln(M_S(\beta))}{\beta}$.

SOLUÇÃO:

$$M_{N_t}(\ln M_X(r)) = e^{rct}$$

$$X \sim \text{Exp}(\alpha) \quad N_t \sim \text{Po}(\lambda t) \quad c = \frac{\ln[M_S(\beta)]}{\beta} \quad M_{N_t}(\ln M_X(r)) = e^{rct}$$

$$e^{\lambda t[M_X(r)-1]} = e^{r \frac{\ln[M_S(\beta)]}{\beta} t}$$

$$\lambda(M_X(r) - 1) = r \frac{\ln[M_S(\beta)]}{\beta}$$

$$\frac{\beta\lambda}{r} \left(\frac{\alpha}{\alpha - r} - 1 \right) = \ln e^{\lambda[M_X(\beta)-1]}$$

$$\frac{\beta\lambda}{r} \left(\frac{\alpha}{\alpha - r} - 1 \right) = \lambda[M_X(\beta) - 1]$$

$$\frac{\beta}{r} \left(\frac{\alpha}{\alpha - r} - 1 \right) = \left(\frac{\alpha}{\alpha - \beta} - 1 \right)$$

$$X \sim \text{Exp}(\alpha) \quad N_t \sim \text{Po}(\lambda t) \quad c = \frac{\ln[M_S(\beta)]}{\beta} \quad M_{N_t}(\ln M_X(r)) = e^{rct}$$

...

$$\frac{\beta}{r} \left(\frac{r}{\alpha - r} \right) = \left(\frac{\beta}{\alpha - \beta} \right)$$

$$\left(\frac{r}{\alpha - r} \right) = \left(\frac{r}{\alpha - \beta} \right)$$

$$r\alpha - r\beta = r\alpha - r^2$$

$$r^2 - r\beta = 0$$

- $r = 0$
- **$R = \beta$**

EXEMPLO 2: Considere que a variável aleatória associada a 1 sinistro seja $X \sim \text{Exp}(\alpha)$ e $N_t \sim \text{Po}(\lambda t)$. Encontre o valor de R considere o prêmio baseado no valor esperado, $c = \frac{\lambda}{\alpha} + \frac{2\lambda}{\alpha^2} \theta$.

$$X \sim \text{Exp}(\alpha)$$

$$N_t \sim \text{Po}(\lambda t)$$

$$c = \frac{\lambda}{\alpha} + \frac{2\lambda}{\alpha^2} \theta$$

$$e^{\lambda t [M_X(r) - 1]} = e^{rct}$$

$$\lambda t [M_X(r) - 1] = rct$$

$$\frac{\alpha}{\alpha - r} - 1 = r \left(\frac{1}{\alpha} + \frac{2\theta}{\alpha^2} \right)$$

$$\left(\frac{r}{\alpha - r} \right) = r \left(\frac{\alpha + 2\theta}{\alpha^2} \right)$$

$$\alpha^2 = (\alpha + 2\theta)(\alpha - r)$$

$$\alpha^2 = \alpha^2 + 2\alpha\theta - \alpha r - 2\theta r$$

$$0 = 2\alpha\theta - r(\alpha + 2\theta)$$

$$R = \frac{2\alpha\theta}{\alpha + 2\theta}$$

Um caso especial amplamente abordado na literatura é quando $N_t \sim Po(\lambda t)$, assim:

$$M_{N_t}(\ln M_X(r)) = e^{rct}$$

$$e^{\lambda t(M_X(r)-1)} = e^{rct}$$

$$\lambda t(M_X(r) - 1) = rct$$

$$M_X(r) = \frac{rc}{\lambda} + 1$$

Caso $c = E(S)(1 + \theta) = \lambda E(X)(1 + \theta)$, então:


$$1 + (1 + \theta)E(X)r = M_X(r)$$

PROBABILIDADE DE RUÍNA NO HORIZONTE INFINITO - POISSON COMPOSTO

- Seja X a variável aleatória que representa o valor de um sinistro, o coeficiente de ajustamento $r = R$ é a menor solução não trivial da equação em r :

$$M_X(r) = \frac{rc}{\lambda} + 1$$

Em que $M_X(r) = E(e^{rX})$, função geradora de momentos de X .



PROBABILIDADE DE RUÍNA NO HORIZONTE INFINITO - POISSON COMPOSTO

Caso $c \leq E(S)$ temos que $\frac{rc}{\lambda} + 1$ e $M_X(r)$ somente se interceptaram no ponto $R = 0$ e esse seria então o coeficiente de ajustamento, sendo assim:


$$\psi(u) = \frac{e^{-0u}}{E(e^{-0U(T)} | T_t < \infty)} = 1$$

$$E(U_t) \leq 0$$

Ou seja, a escolha do prêmio puro de risco, certamente levará a ruína.

Considere $N_t \sim Po(\lambda t)$, $X \sim Exp(\alpha)$ e $c = E(S)$, Então $f(r) = M_X(r) = \frac{0,05}{0,05-r}$ $g(r) = \frac{rc}{\lambda} + 1$

- Para $\alpha = 0,05$ e $\lambda = 10$ temos $E(S) = 200$, logo $g(r) = \frac{r}{0,05} + 1$.
- Para $c = 1,3E(S) = 260$ temos $g(r) = 26r + 1$,



EXEMPLO 3: Considere que a variável aleatória associada a 1 sinistro seja $X \sim \text{Exp}(\alpha)$. Encontre o coeficiente de ajustamento dado que:

Solução:

$$1 + (1 + \theta)E(X)r = M_X(r)$$

...

EXEMPLO 3: Considere que a variável aleatória associada a 1 sinistro seja $X \sim Exp(\alpha)$. Encontre o coeficiente de ajustamento.

$$1 + (1 + \theta)E(X)r = M_X(r)$$

SOLUÇÃO:

$$1 + \frac{(1 + \theta)}{\alpha}r = \frac{\alpha}{\alpha - r}$$

$$\alpha^2 + \alpha r + \alpha\theta r - \alpha r - r^2 - \theta r^2 - \alpha^2 = 0$$

$$(1 + \theta)r^2 - \theta\alpha r = 0$$

$$R = \frac{\theta\alpha}{1 + \theta}$$

PROBABILIDADE DE RUÍNA NO HORIZONTE INFINITO - $N_t \sim Po(\lambda t)$

$$c = (1 + \theta)E(S)$$

$$1 + (1 + \theta)E(X)r = M_X(r).$$


Dependendo da distribuição de X , não é possível encontrar analiticamente o coeficiente de ajustamento R . Geralmente, métodos numéricos são utilizados e um valor inicial para R é requerido.

MÉTODO ITERATIVO DE NEWTON-RAPHSON

- Tem o objetivo estimar as raízes de uma função.
- Escolhe-se uma aproximação inicial.
- Calcula-se a equação da reta tangente da função neste ponto e a interseção dela com o eixo das abcissas, afim de encontrar uma melhor aproximação para a raiz.

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

- Repete-se o processo até a convergência para o valor de x .



$$\operatorname{tg}(\alpha) = \frac{f(x_0)}{x_0 - x_1} \rightarrow f'(x_0) = \frac{f(x_0)}{x_0 - x_1} \rightarrow x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)}$$

Logo a reta tangente a $f(x)$ que passa no ponto x_2 é dada por:

$$\operatorname{tg}(\alpha) = \frac{f(x_1)}{x_1 - x_2} \rightarrow f'(x_1) = \frac{f(x_1)}{x_1 - x_2} \rightarrow x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)}$$

De modo geral

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

EXEMPLO 4: Encontre a raiz quadrada de 5 usando o método de NEWTON-RAPHSON

SOLUÇÃO

Considere $x = \sqrt{5}$, então $x^2 = 5$, logo $x^2 - 5 = 0$ logo iremos usar o método para achar a raiz da função $f(x) = x^2 - 5$.

Dessa forma, $f(x) = x^2 - 5$, então $f'(x) = 2x$, então:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^2 - 5}{2x_n}$$

EXEMPLO 4: Considere $x = \sqrt{5}$, então $x^2 = 5$, logo $x^2 - 5 = 0$ logo iremos usar o método para achar a raiz da função $f(x) = x^2 - 5$. Dessa forma

$f(x) = x^2 - 5$, então $f'(x) = 2x$, então

$$x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^2 - 5}{2x_n}$$

É sensato supor que a raiz estará entre 2 e 3 pois $2^2 = 4$ e $3^2 = 9$, assim $x_0 = 2,5$

$$x_1 = 2,5 - \frac{f(2,5)}{f'(2,5)} = 2,25$$

$$x_2 = 2,25 - \frac{f(2,25)}{f'(2,25)} = 2,2361$$

$$x_3 = 2,2361 - \frac{f(2,2361)}{f'(2,2361)} = 2,236068$$

$$x_4 = 2,236068 - \frac{f(2,236068)}{f'(2,236068)} = 2,236068$$

$$c = (1 + \theta)E(S)$$

A velocidade da convergência (caso ocorra) é fortemente relacionada a escolha do valor inicial para x_0 .

No caso da utilização do método para determinar o valor do coeficiente de determinação R o valor indicado como melhor escolha é dado por:

$$R_0 = \frac{2\theta E(X)}{E(X^2)}$$

Uma vez que esse resultado corresponde ao valor máximo de R , conforme a desigualdade.

$$R < \frac{2\theta E(X)}{E(X^2)}.$$

EXEMPLO 5: Suponha que o sinistro agregado S tem distribuição de Poisson composta, com parâmetro $\lambda = 4$. Considere que o prêmio recebido é igual a 7 ($c = 7$) e que a distribuição de X é dada por:

$$P(X = 1) = 0,6 ; \quad P(X = 2) = 0,4.$$

Determine o coeficiente de ajustamento.

Solução

Sendo que o coeficiente de ajustamento $R > 0$ satisfaz $H(R) = 0$. Para resolver tal equação, pode-se utilizar o método iterativo de Newton-Raphson .

Como $1 + (1 + \theta)E(X)r = M_X(r)$, definimos

$$H(r) = 1 + (1 + \theta)E(X)r - M_X(r)$$

SOLUÇÃO

$$H(r) = 1 + (1 + \theta)E(X)r - M_X(r)$$

Assim:

$$R_{j+1} = R_j - \frac{H(R_j)}{H'(R_j)}.$$

Considerando o valor inicial $R_0 = \frac{2\theta E(X)}{E(X^2)}$.

Solução

Considerando o valor inicial $R_0 = \frac{2\theta E(X)}{E(X^2)}$

$$E(X) = 1(0,6) + 2(0,4) = 1,4$$

$$E(X^2) = 1(0,6) + 4(0,4) = 2,2$$

$$c = (1 + \theta)E(S) = (1 + \theta)E(N)E(X) = (1 + \theta)\lambda E(X)$$

$$\theta = \frac{c}{\lambda E(X)} - 1 = \frac{7}{4(1,4)} - 1 = 0,25$$

$$M_X(r) = E(e^{rX}) = \sum_x e^{rX} p(X = x) = 0,6e^r + 0,4e^{2r}.$$

SOLUÇÃO

$$H(r) = 1 + (1 + \theta)E(X)r - M_X(r)$$

$$H(r) = 1 + 1,75r - 0,6e^r - 0,4e^{2r}$$

$$H'(r) = 1,75 - 0,6e^r - 0,8e^{2r}$$

$$R_{j+1} = R_j - \frac{1 + 1,75R_j - 0,6e^{R_j} - 0,4e^{2R_j}}{1,75 - 0,6e^{R_j} - 0,8e^{2R_j}}$$

$$R_0 = \frac{2\theta E(X)}{E(X^2)} = 0,3182$$

$$R_1 = 0,3182 - \frac{1 + 1,75(0,3182) - 0,6e^{(0,3182)} - 0,4e^{2(0,3182)}}{1,75 - 0,6e^{(0,3182)} - 0,8e^{2(0,3182)}}$$

$$R_1 = 0,3182 - \frac{1 + 1,75(0,3182) - 0,6e^{(0,3182)} - 0,4e^{2(0,3182)}}{1,75 - 0,6e^{(0,3182)} - 0,8e^{2(0,3182)}}$$

...

j	R_j	$H(R_j)$	$H'(R_j)$	R_{j+1}
0	0,3182	-0,0238	-0,5865	0,2776
1	0,2776	-0,0031	-0,4358	0,2705
2	0,2705	-0,0001	-0,4106	0,2703
3	0,2703	0,0000	-0,4098	0,2703

Referências

- LEMOS, S., R., R. **Probabilidade de Ruína no mercado de Seguros; fundamentos teóricos e alguns resultados de simulação.** Dissertação, Universidade Federal de Pernambuco, 2008.
- RAMOS, P. A. F. L.. **Princípios de cálculo de prêmios e medidas de risco em modelos atuariais,** Tese de Mestrado, Universidade do Minho, Portugal, 2014.
- PIRES, M.D.; COSTA, L.H.; FERREIRA, L.; MARQUES, R. **Teoria do risco atuarial: Fundamentos e conceitos.** Curitiba: CRV 2020.



Teoria do Risco

Aula 20-Parte 2

Danilo Machado Pires
danilo.pires@unifal-mg.edu.br

PROBABILIDADE DE RUÍNA NO HORIZONTE INFINITO - POISSON COMPOSTO, $c = (1 + \theta)E(S)$

- Quando o processo ruína no horizonte infinito é Poisson composto com $X \sim Exp(\alpha)$

$$\psi(u) = \frac{e^{-Ru}}{E(e^{-RU(T_t)} | T_t < \infty)} = \frac{\alpha - R}{\alpha} e^{-Ru}$$

Como $R = \frac{\theta\alpha}{1+\theta}$, então

$$\psi(u) = \frac{\alpha - \frac{\theta\alpha}{1+\theta}}{\alpha} e^{-\frac{\theta\alpha}{1+\theta}u} = \frac{1}{1+\theta} e^{-\left(\frac{\alpha\theta u}{1+\theta}\right)}$$

$$\psi(0) = \frac{1}{1+\theta}$$

EXEMPLO 1: Considere que $X \sim Exp(0,8)$, $u = 5$ e $\theta = 0,3$. Então calcule a probabilidade de Ruína para o segurador.

Solução

$$\psi(u) = \frac{1}{1 + \theta} e^{-\left(\frac{\alpha\theta u}{1+\theta}\right)}$$


EXEMPLO 1: Considere que $X \sim Exp(0,8)$, $u = 5$ e $\theta = 0,3$. Então calcule a probabilidade de Ruína para o segurador.

Solução

$$\psi(u) = \frac{1}{1 + \theta} e^{-\left(\frac{\alpha\theta u}{1+\theta}\right)} = \frac{1}{1 + 0,3} e^{-\left(\frac{0,8 \times 0,3 \times 5}{1+0,3}\right)}$$

$$\psi(5) \approx 0,3056$$

Considere que $X \sim Exp(0,8)$, $\theta = 0,3$.



PROBABILIDADE DE RUÍNA NO HORIZONTE INFINITO - POISSON COMPOSTO

Quando o processo de ruína no horizonte infinito é Poisson composto com $X \sim Exp(\alpha)$, e $c = E(S)(1 + \theta)$, temos:

$$\psi(u) = \frac{1}{1 + \theta} e^{-\left[\frac{\theta u}{E(X)(1 + \theta)}\right]}$$

A função acima pode ser escrita de forma mais geral para diferentes valores de c , tal que:

$$\psi(u) = \frac{E(S)}{c} e^{-\left[E(X) - \frac{\lambda}{c}\right]u}$$

EXEMPLO 2: Considere um processo de reserva em tempo contínuo, onde os sinistros individuais X seguem uma distribuição exponencial com $\alpha = 0,8$ e $N_t \sim Po(10t)$. Então determine a probabilidade de ruína para:

$$a) c = \frac{\ln(M_S(0,2))}{0,2}.$$

$$b) c = E(S) + var(S)0,2.$$

Solução $\lambda = 10, \alpha = 0,8$

$$a) c = \frac{\ln(M_S(0,2))}{0,2} = \frac{\ln\left[e^{\lambda\left(\frac{\alpha}{\alpha-0,2}-1\right)}\right]}{0,2} \approx 16,667$$

$$\psi(u) = \frac{E(S)}{c} e^{-\left[E(X)-\frac{\lambda}{c}\right]u} = 0,75e^{-(0,65)u}$$

$$b) c = E(S) + \text{var}(S)0,2 = \frac{\lambda}{\alpha} + \frac{2\lambda}{\alpha^2}0,2 \approx 18,75$$

$$\psi(u) = \frac{E(S)}{c} e^{-\left[E(X)-\frac{\lambda}{c}\right]u} \approx 0,6667e^{-(0,71666)u}$$

$$\psi(u) = 0,7692308e^{-(0,1846154)u}$$


$$\psi(u) = 0,75e^{-(0,65)u}$$

$$\psi(u) = 0,6667e^{-(0,71666)u}$$

$$c = E(S)(1 + 0,3) = 16,25$$

$$c = \frac{\ln(M_S(0,2))}{0,2} \approx 16,667$$

$$c = E(S) + \text{var}(S)0,2 = 18,75$$



PROBABILIDADE DE RUÍNA

Desigualdade de Lundberg: Limitante superior para a probabilidade da ruína...

$$\psi(u) < e^{-Ru}$$

$$\psi(u)_{max} = e^{-Ru}$$

Nota-se que $\lim_{u \rightarrow +\infty} \psi(u) = 0$

Se X tem um suporte limitado, de tal forma que $P(X \leq m) = 1$, para alguma m , finito, então

$$\psi(u) > e^{-R(u+m)}$$

* m limite suporte

EXEMPLO 3: Novamente considere que $X \sim \text{Exp}(0,8)$, $u = 5$ e $\theta = 0,3$. Então calcule a probabilidade máxima de Ruína para o segurador.

Solução

EXEMPLO 3: Novamente considere que $X \sim Exp(0,8)$, $u = 5$ e $\theta = 1,282$. Então calcule a probabilidade máxima de Ruína para o segurador.

Solução


$$R = \frac{\theta\alpha}{1 + \theta} = \frac{0,3 \times 0,8}{1 + 0,3} \approx 0,1846$$

Logo

$$\psi(5)_{max} = e^{-0,1846 \times 5} \approx 0,3973$$

Para efeito de comparação

$$\psi(5) = \frac{1}{1 + 0,3} e^{-\left(\frac{0,8 \times 0,3 \times 5}{1 + 0,3}\right)} \approx 0,3056$$



EXEMPLO 4: Então determine a probabilidade máxima de ruína com base no limite superior da desigualdade de Lundberg, os casos do exemplo 2.

$$a) c = \frac{\ln(M_S(0,2))}{0,2}.$$

$$b) c = E(S) + \text{var}(S)0,2.$$


Solução

a) $c = \frac{\ln(M_S(0,2))}{0,2}$. Como já visto para essa situação $R = \beta = 0,2$ então

$$\psi(u)_{max} = e^{-0,2 \times u}.$$

b) $c = E(S) + var(S)0,2$. Como já visto $R = \frac{2\alpha 0,2}{\alpha + 2(0,2)}$, então

$$\psi(u)_{max} = e^{-0,26667 \times u}$$



PROBABILIDADE DE RUÍNA

Considerando ϵ como o limite superior da probabilidade de ruína para o montante inicial u , ou seja

$$\psi(u) < e^{-Ru} = \epsilon$$

Então $e^{-Ru} = \epsilon$ implica em

$$R = \frac{|\ln(\epsilon)|}{u}$$

Como $M_{N_t}(\ln M_X(r)) = e^{rct} \rightarrow M_S(R) = e^{Rc}$, então

$$c = \frac{\ln(M_S(R))}{R} = u \frac{\ln\left(M_S\left(\frac{|\ln(\epsilon)|}{u}\right)\right)}{|\ln(\epsilon)|}$$

c é um valor de prêmio baseado na probabilidade de ruína ϵ

PROBABILIDADE DE RUÍNA

➤ Princípio da variância

$$\Pi_S = E(S) + \alpha \times \text{var}(S) \quad \text{em que } \alpha = \frac{R}{2}$$

➤ Princípio do desvio padrão

$$\Pi_S = E(S) + \beta \sqrt{\text{var}(S)} \quad \text{em que } \beta = \sqrt{2i|\ln(\epsilon)|}, \quad 0 < i < 1$$

ϵ é um limite superior para a probabilidade de ruína

i uma determinada porcentagem do capital inicial u considerada no valor do prêmio

PROBABILIDADE DE RUÍNA

➤ Uma vez definido que

$$\psi(u) \leq e^{-Ru}$$

então $\psi(u)_{max} = e^{-Ru} = \epsilon$, é possível determinar o valor de θ com base em ϵ , logo

$$\theta \approx \frac{u \left[M_X \left(-\ln \left(\frac{\epsilon}{u} \right) \right) - 1 \right]}{-E(X) \ln(\epsilon)} - 1$$

em que $u = U(0)$.

PROBABILIDADE DE RUÍNA

- O modelo de Crámer-Lundberg varia como consequência do equilíbrio entre indenizações pagas e prêmios arrecadados.
 - Coeficiente de ajustamento
- Pouco realista ao considerar os prêmios arrecadas de forma constante, e o fato de lidar exclusivamente com X_{is} *iid*.
- Na maioria dos casos não é possível conseguir uma expressão fechada para probabilidade de ruína.

➤ Aproximação de Vydler

Baseada em igualar momentos de um processo definido com os do modelo de Cramér-Lundberg.

➤ Aproximação de Beekman-Bowers

Baseada em relacionar a probabilidade de sobrevivência com a distribuição gama.

PROBABILIDADE DE RUÍNA

➤ Aproximação via simulação de Cramér-Lundberg

Possibilita aproximações das probabilidades de ruína do máximo esperado para os prejuízos da seguradora, do valor esperado para a reserva na primeira ruína....

LEMOS, Regina Ribeiro Lemos. **Probabilidade da ruína no mercado de seguros: fundamentos e alguns resultados de simulação**. 2008. Dissertação (Mestrado).

RAMOS, Pedro Alexandre Fernandes Lima. **Princípios de cálculo de prêmios e de medidas de risco em modelos atuariais**. 2014. Tese de Doutorado.

PROBABILIDADE DE RUÍNA- Simulação

$$c = (1 + \theta)E(S) \quad X_i \sim \text{Gamma}(900,1)$$

$$N_t \sim \text{Po}(0,2t)$$


$$N_t \sim \text{Po}(0,2t) \rightarrow T \sim \text{Exp}(0,2)$$

$$u = U(0) = 600$$


$$\theta = 0,3$$

$$U(t) = 600 + (1 + 0,3)900 \times 0,2t - \sum_{i=1}^{N_t} X_i$$

Gerar 400 valores de T , logo, o tempo necessário para a ocorrência de cada um dos 400 sinistros.



- Ruína em 5 das 10 simulações
- Em média, a ruína surgiu pela primeira vez na 5ª indenização e no máximo ocorreu pela primeira vez na 11ª indenização.



➤ Ruína em 9 das 10 simulações

➤ Em média, a ruína surgiu pela primeira vez na 6ª indenização e no máximo ocorreu na 29ª.

PROBABILIDADE DE RUÍNA- Simulação

$$c = (1 + \theta)E(S) \quad X_i \sim \text{Gamma}(900,1) \quad N_t \sim \text{Po}(0,2t)$$

$$\triangleright U(t) = 600 + 900 \times 0,2t - \sum_{i=1}^{N_t} X_i$$

- Em 9602 das 10000 simulações ocorreu ruína
- Em média, a ruína surgiu pela primeira vez na 16° indenização e no máximo ocorreu na **396°**
- $\psi(600) \approx 0,9602$

$$\triangleright U(t) = 600 + (1 + 0,3)900 \times 0,2t - \sum_{i=1}^{N_t} X_i$$

- Em 6136 das 10000 simulações ocorreu ruína
- Em média, a ruína surgiu pela primeira vez na 5° indenização e no máximo ocorreu na **173°**
- $\psi(600) \approx 0,6136$

PROBABILIDADE DE RUÍNA- Simulação

$$c = (1 + \theta)E(S) \quad X_i \sim \text{Gamma}(900,1) \quad N_t \sim \text{Po}(0,2t)$$

$$\triangleright U(t) = 600 + (1 + 0,3)900 \times 0,2t - \sum_{i=1}^{N_t} X_i$$

- Em 6136 das 10000 simulações ocorreu ruína
- Em média, a ruína surgiu pela primeira vez na 5º indenização e no máximo ocorreu na **173º**
- $\psi(600) \approx 0,6136$

$$M_X(r) = \frac{rc}{\lambda} + 1 \rightarrow \frac{1}{(1-r)^{900}} = 1179r + 1$$

$$R \approx 5,5887 \times 10^{-4}$$

$$\psi_{max}(600) = e^{-600(5,5887 \times 10^{-4})} = \mathbf{0,7153}$$

PROBABILIDADE DE RUÍNA- Simulação

O maior valor do montante pelo qual $U(t)$ desce abaixo de $U(0)$, é chamado de perda agregada máxima, e é representado por L tal que:

$$L = \max_{t \geq 0} \{S_t - ct\}$$

e

$$P(L > u) = \psi(u)$$

$$E(L) = \frac{\lambda E(X^2)}{2[c - \lambda E(X)]}$$

$$\text{var}(L) = \frac{\lambda [4E(X^3)(c - \lambda E(X)) + 3\lambda E(X^2)^2]}{12[c - \lambda E(X)]^2}$$

Para a simulação anteriores temos que:

$$X_i \sim \text{Gamma}(900,1)$$

$$N_t \sim \text{Po}(0,2t)$$

$$E(X) = \left(\frac{900}{1}\right) = 900$$

$$\text{var}(X) = \left(\frac{900}{1^2}\right) = 900$$

- $c = (1 + \theta)E(S)$

$$c = (1,3)900 \times 0,2 = 234$$

$$E(L) = \frac{\lambda E(X^2)}{2[c - \lambda E(X)]} = \frac{0,2(900 + 900^2)}{2(234 - 180)} = 1501,66$$

Referências

- LEMOS, S., R., R. **Probabilidade de Ruína no mercado de Seguros; fundamentos teóricos e alguns resultados de simulação.** Dissertação, Universidade Federal de Pernambuco, 2008.
- RAMOS, P. A. F. L.. **Princípios de cálculo de prêmios e medidas de risco em modelos atuariais,** Tese de Mestrado, Universidade do Minho, Portugal, 2014.
- PIRES, M. D.; COSTA, L. H.; FERREIRA, L.; MARQUES, R. **Teoria do risco atuarial: Fundamentos e conceitos.** Curitiba: CRV 2020.

